



PROCOLE : QUE FAIRE EN CAS DE SUSPICION DE COVID 19

Au préalable, identifier un référent COVID et un local avec des surfaces facilement lavables

Signes : Fièvre > 37,8°C (ou sensation de fièvre), frissons ; Toux, mal de gorge ; Difficultés à respirer ou une sensation d'oppression dans la poitrine ; Fatigue intense inexplicable ; Douleurs musculaires inexplicables ; Maux de tête inhabituels ; Perte de l'odorat ; Perte du goût des aliments ; Diarrhée

1. La personne qui porte assistance se protège

Porter des lunettes de protection ou une visière, des gants jetables et un masque chirurgical ou FFP2.

Se laver les mains avec eau-savon ou lotion hydroalcoolique.

Préparer des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces de contact.

Se doter d'un sac à déchets.

2 Isoler la personne dans le local aéré,

- Lui faire porter un masque du type chirurgical,
 - Respecter les mesures barrières
 - Garder une distance avec elle (au moins 1m), ne pas la déséquiper,
 - **en cas de signe de détresse** (difficulté à terminer ses phrases sans pause, difficulté orale à parler ou à avaler, personne bleue, perte de connaissance – somnolence – confusion, **appelez le SAMU - composer le 15** (en étant suffisamment proche de la victime afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) :
 - **en l'absence de signe de détresse**, demandez à la personne de contacter son médecin traitant, ou tout autre médecin, puis organisez son retour à domicile, selon l'avis médical.
 - Lister les personnes qui l'ont côtoyé de façon rapprochée (sans masque, moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes) depuis l'apparition des symptômes et dans les 48h qui précèdent pour faciliter le contact tracing pour les cas avérés (recherche des moments sans mesures barrière : pause café, cigarette, repas, vestiaires, transports communs L'utilisation de TOUSANTICOVID peut être en ce sens utile.
- Le transport de la personne s'effectuera :
- avec masque
 - de préférence avec le véhicule personnel
 - en excluant les transports en commun en l'absence de signe de gravité
- **Favoriser le télétravail de collègue contact en cas de doute si possible**

3. Après le départ du salarié :

En attendant la désinfection de la zone et avant de se déséquiper, la personne qui porte assistance s'assure de :

- laisser ouverts les ouvrants donnant sur l'extérieur
- Signaler et matérialiser chaque surface qui a été souillée.
- Noter l'heure d'intervention sur la porte et la durée de 3 heures mini nécessaire
- Déterminer avec le gestionnaire du site les installations à neutraliser si nécessaire (climatisation, ventilation, escaliers.. ;)
- Condamner si besoin certains locaux collectifs (salle de pause, toilettes...)

4. La personne qui a porté assistance se déséquipe

Se munir d'un sac, retirer ses lunettes de protection, retirer le masque, retirer les gants en veillant à ne pas toucher la surface extérieure. Mettre le tout dans un sac plastique et le fermer.

Placer ce sac dans un deuxième sac qu'elle ferme à son tour.

Abandonner le tout sur place jusqu'à la désinfection.

Se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique.

Informez les autres salariés d'un cas possible d'infection afin qu'ils soient vigilants à l'apparition éventuelle de symptômes (**fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et de l'odorat**) et qu'ils restent à domicile si c'est le cas.

DANS TOUS LES CAS, À L'ISSUE, PRÉVENIR LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL


5 Nettoyage du sol, des surfaces et des objets touchés.

Une désinfection visant le SARS-CoV-2 est réalisée avec un produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019), ou avec d'autres produits comme l'eau de Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide). Ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression, ne pas secouer les chiffons, ne pas utiliser d'aspirateur sauf s'ils sont HEPA...,

Les personnels de nettoyage des locaux seront équipés de leurs EPI usuels

ISOLEMENT : QUE FAIRE ?

Actuellement des variantes du SARS-CoV-2, plus contagieuses, circulent.
Il convient de rester extrêmement vigilant et d'appliquer chaque jour tous les gestes barrières.
Au moindre symptôme, isolez-vous immédiatement et faites-vous tester.



À la sortie de l'isolement, je respecte strictement les gestes barrières, j'évite tout rassemblement ou contact avec des personnes à risque de forme grave de COVID-19 les 7 jours suivants la levée de l'isolement, et je privilégie si possible le télétravail

Je suis contact d'une personne malade dans le même foyer familial. Je reste isolé 7 jours de plus après les 10 jours d'isolement du malade et je refais un test à J17.